

# INFARTO CRÔNICO DA ARTÉRIA RECORRENTE DE HEUBNER (ARH)




## ACHADOS DE IMAGEM




Tomografia computadorizada

Lesão hipodensa, **com efeito atrófico** comprometendo a cabeça do núcleo caudado, o **putâmen** anterior e braço anterior da cápsula interna.



FLAIR



DWI

Ressonância magnética


Área hipointensa com tênue halo hiperintenso em FLAIR, sem restrição à DWI.

Discreta **ectasia compensatória** do ventrículo lateral direito.

# INFARTO CRÔNICO DA ARTÉRIA RECORRENTE DE HEUBNER (ARH)



## MAS DE ONDE SURGE A ARH?



A ARH é a maior das artérias lenticuloestriadas mediais.

Tem origem a partir da artéria cerebral anterior (A1, A2 ou da junção entre a ACA-ACoA).

## E QUAIS SÃO OS SINTOMAS:

Complexo de sintomas de déficits motores, sensoriais ou sensório-motores unilaterais flutuantes **que podem afetar** a face, o braço e a perna.

### Território da ARH:



- Cabeça do núcleo caudado;
- Porção medial do globo pálido;
- Braço anterior da cápsula interna;
- Hipotálamo anterior;
- Núcleo **accumbens**;
- Parte do fascículo uncinado;
- Banda diagonal de Broca.

Image courtesy O. Chaigasame

# INFARTO CRÔNICO DA ARTÉRIA RECORRENTE DE HEUBNER (ARH)



RELEMBRANDO...



ARH

lenticulostriadas laterais

lenticulostriadas mediais

Artéria coroidea anterior

Artérias talamoperfuradas

*Radiology Assistant*

neurosky.med.br | EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA





# NEUROsky

EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA

## NEURORRADIOLOGIA

Seja um NEUROSkyer!

#Siga #Curta #Participe #Capacite #Compartilhe



@neurosky.med



@neurosky.med



@neurosky\_med